95
551

TVI 5840

# 南瓜

**俗名：**南瓜

**科名：**Cucurbitaceae

**學名：***Cucurbita* pepo L.

**品種：**Dark Star

**用途：**熟果用

**特性：**種子長圓形、長1.7cm 、寬1.0cm 、厚0.2cm ，珠柄痕尖，種皮灰白色、有裂紋，無環邊，百粒種子重17公克，子葉中等大小、長3cm 、寬1.8cm 、濃綠色，幼莖短，主蔓細，長30cm ，橫徑3cm 、節間長2.5cm 、莖圓形，側蔓少，葉片大、缺刻深，有剛毛和刺、濃綠色，葉脈間斑色爲銀白色，葉斑多，葉柄有刺，葉柄粗且長約45cm ，株型旺盛，花金黃色，定植至開第一朵雌花需60天，第一朵雌花著生在第11節，子房大、長形，萼片尖細，花瓣先端尖，子房茸毛少，花冠直徑12cm ，著果性強，開花至老熟瓜採收日65天，果型長球形，果梗基部不肥大、直徑1.5cm 、果梗圓形，有深稜溝，果臍大，果實平均縱徑37cm 、橫徑6.7/5.5cm ，平均果重1150公克，果梗長15cm 、橫徑1.2cm ，果底凸，果梗質地木質化，果皮縱條紋不顯著，果面光滑、無條溝，果皮厚薄中等，嫩瓜、老熟瓜果皮皆爲濃綠色，甜味中等，果肉黃色，老瓜煮後肉質稍粉質、水份中等，對病毒病具抗性，對白粉病有中等感性。

**引進日期：**78.9.21

**試種單位：**農業試驗所

南瓜

**俗名：**南瓜

**科名：**Cucurbitaceae

**學名：***Cucurbita* pepo L.

**品種：**Early Prolific Straightneck

**用途：**熟果用

**特性：**種子橢圓形、長1.2cm、寬0.8cm、厚0.2cm，珠柄痕尖，種皮黃白色、無裂紋，環邊淡黃色，百粒種子重9公克，子葉綠色、中等大小、長3.2cm、寬1.8cm，幼莖長4cm，主蔓長30cm，橫徑2cm、節間長3cm、莖圓形，側蔓、分枝皆少，葉片大、缺刻深，長23cm、寬27cm、濃綠色，葉脈間斑色爲銀白色，葉斑微少，葉片有剛毛和刺，葉柄粗且有刺、橫徑1.5cm、長15cm、形狀中空，普通株型，花橘黃色，第一朵雌花著生在第20節，子房中等大小，萼片中細，花瓣先端尖，子房茸毛多，花冠直徑10-12cm，著果性中等，開花至嫩瓜採收日25天，開花至老熟瓜採收日65天，果型長球形，果梗基部不肥大、直徑15cm、圓形有淺稜溝，平均果實縱徑24.2cm、橫徑7.8/5.4cm，平均果重611公克，果梗長15cm，橫徑1.5cm，果底凸，果梗木質化，果皮縱條紋粗，果面有突瘤、無條溝，嫩瓜果皮淺黃色，老熟瓜果皮橙黃色，果肉淡黃色、厚度中等，水份稍少，易感病毒病，但對白粉病具抗性。

**引進日期：**78.9.21

**試種單位：**農業試驗所

TVI 5843

南瓜

**俗名：** 南瓜

**科名：** Cucurbitaceae

**學名：** *Cucurbita* pepo L.

**品種：** Early Summer Crookneck

**用途：** 嫩果用

**特性：** 種子橢圓形、長1.4cm 、寬0.8cm 、厚0.2cm ，珠柄痕尖，種皮黃白色、無裂紋，環邊淡黃色，百粒種子重9公克，子葉大、長2.8cm 、寬1.6cm 、綠色，幼莖長8cm ，主蔓粗、長150cm 、橫徑2～3 cm 、節間長5cm 、莖五角稜形，側蔓少，葉片缺刻深淺中等，葉片大、長27cm 、寬27cm 、濃綠色，葉脈間斑色為銀白色，葉斑少，葉片、葉柄皆有剛毛，葉柄粗細中等、長35cm 、橫徑1.8cm ，形狀中空，普通株型，花淡黃色，第一朵雌花著生在第6～7節，子房中等大小、長形、茸毛少，萼片尖細，花瓣先端尖，花冠直徑6～8cm ，著果性強，開花至嫩瓜採收日30天，開花至老熟瓜採收日55～60天，果型木瓜形，果梗基部不肥大、直徑1.5cm 、呈五角形有淺稜溝，果臍大，平均果實縱徑19cm 、橫徑3.8/ 5.9cm ，平均果重280公克，果梗長10cm 、橫徑1.2cm ，質地木質化，果底凸，果皮厚、縱條紋不顯著，果面有突瘤和條溝，嫩瓜果皮黃色，果肉橙色、厚度中等。

**引進日期：** 79.9.21

**試種單位：** 農業試驗所

5844
3/8

**俗名：**南瓜

**科名：**Cucurbitaceae

**學名：***Cucurbita* pepo L.

**品種：**Black Beauty

**用途：**熟果用

**特性：**種子長圓形、長1.4cm、寬0.8cm、厚0.15cm，珠柄痕尖，種皮黃白色、無裂紋，環邊黃白色，百粒種子重10公克，子葉長2.8cm、寬1.6cm、綠色，主蔓長25cm、橫徑2cm、節間長3cm、莖圓形，側蔓少，葉片缺刻中等，葉片大、長25cm、寬24cm、濃綠色，葉脈間有微黃綠色之斑，葉斑甚少，葉片、葉柄皆有剛毛，葉柄中等粗細、橫徑1.5～2cm，葉柄長35～40cm、形狀中空，株型旺盛，花爲淡黃色，第一朵雌花著生在第4～5節，子房茸毛多、中等大小、長形，萼片尖細，花瓣先端尖，花冠直徑5cm，著果性弱，開花至嫩瓜採收日25天、至老熟瓜採收日60天，果長球形，果梗基部不肥大、直徑1.5cm、果梗五角形、稜溝淺，果實平均縱徑33.4cm、橫徑8.25/5.4cm，平均果重999公克，果梗長8cm、橫徑1.5cm，果底凸，果皮無縱條紋，果面光滑、無條溝，果皮堅硬，嫩瓜、老熟瓜果皮皆爲濃綠色，甜味中等，果肉黃色，老果煮後肉質稍粉質、水份中等，抗病毒病，對白粉病亦有中等抗性。

**引進日期：**78.9.21

**試種單位：**農業試驗所

胡瓜

**俗名：** 胡瓜

**科名：** Cucurbitaceae

**學名：** *Cucumis sativus* L.

**品種：** 瀋陽黃瓜(農委87號)

**用途：** 食用

**特性：** 有卷鬚，主蔓長、節長，側蔓數少，葉片大、濃綠色，普通株型，花黃色，第一朶雄花開花始期30天，第一朶雌花開花在第7節，子房大、長形，著果性中等，開花至採收日12～14天，花性爲雌雄異花同株，果型大瓜形，果梗部、果臍部皆平圓，果臍部小，成熟果果皮無網紋，商品果果實縱徑35cm、橫徑9cm，果梗長3cm、橫徑1cm，商品果深綠色，有果皮條溝，果面粗糙，果粉少，果刺細且多，對病毒病、露菌病皆具抗性，對白粉病、萎凋病、疫病有中等抗性。

**引進日期：** 79.9.14

**試種單位：** 農業試驗所

TVI 6307

苦瓜

**俗名：**苦瓜

**科名：**Cucurbitaceae

**學名：***Momordica charantia* L.

**品種：**遼寧苦瓜(農委86號)

**用途：**食用、藥用

**特性：**種子橢圓形、長1.5cm、寬0.8cm、厚0.3cm，種皮黃白色、無花紋，子葉中大、綠色，莖蔓甚長，主蔓粗細中等、橫徑0.5cm，主蔓節中長、長7cm，葉片缺裂深、大小中等、濃綠色，葉柄長，普通株型，分枝性多，花黃色，早上開花，定植至開第一朵雌花需45天，母蔓第一朵雌花開於第30節，子房中大、長2.5cm、寬0.2cm、細長形，著果性中等，開花至採收日15～20天，定植至採收日60天。果型長橢圓形、果實縱徑24cm、橫徑5～6cm，果梗長9cm，果面如珍珠突起、條溝略深，裂果程度中等，果皮黃白色，苦味中等，果肉厚度1.1cm，對萎凋病、病毒病皆具抗性，對露菌病具抗性，易感染瓜實蠅。

**引進日期：**79.9.14

**試種單位：**農業試驗所


TVI 6308

**俗名：**香芋

**科名：**Leguminosae

**學名：***Apios fortunei* Maxim L

**品種：**土圞兒

**用途：**主要爲食用

**特性：**莖綠色且細，莖上絨毛少、無刺，葉片薄，中等大小、綠色、無刺、下表皮茸毛少，葉緣無缺刻，葉柄中長，盛花期株形匍匐型，分枝性強，每一花序花數3朵以上，花朵大小中等、白色，花柱短，無雄不稔性，果形球形，果頂部平滑，果底部尖形，花痕部小，食用果果皮白色，成熟果果皮淺褐色，果實無彎曲度，果面稍有光澤，果梗細，果蒂淡褐色，果蒂下之著色淡褐，果蒂小，果萼、果梗皆無刺，果皮質微軟，果肉白色，肉質緻密。耐寒性、耐旱性皆中等，耐熱性、耐濕性皆弱，對病毒病、青枯病、輪紋病、果疫病、灰黴病、細菌性斑點病皆具抗性，對苗立枯病、蚜蟲、粉蝨、浮塵子、蕃茄夜蛾皆有中等抗性，對萎凋病、根瘤線蟲之感染程度中等。

**引進日期：**82.3.26

**試種單位：**高雄改良場

香　芋
(土圞兒)
95 3 9

香　芋
(土圞兒)

鵲豆

**俗名：**鵲豆

**科名：**Leguminosae

**學名：***Dolichos lablab* L.

**品種：**老母豬耳朵（紅仁）

**用途：**嫩豆（或乾豆）供食用

**特性：**種子長1.5cm、寬1.2cm、厚0.7cm、腎臟形，種皮無斑紋、底色褐色、光澤陰暗、脈紋不明顯，種臍無環色，百粒種子重40公克，子葉大、綠色，幼莖胚軸長6cm、綠色，主莖節間長13～15cm，主莖粗，分枝性強，株高61cm以上，分枝匍匐型，耐倒伏性強，小葉中等大小、長12cm、寬10.5cm、綠色、三角形，株型爲無限型蔓性，株勢粗大旺盛，播種至開花日50天，開花至嫩豆採收日25天，第一花序著生在第5節，每一花序3～5朵，花朵中等大小、花白色，花序長度3cm，每花序著莢數2～3莢，莢長8.4cm、寬2.7cm、厚0.3cm，豆莢稍曲，每莢種仁4～5粒，莢尖短、長約1cm、呈直狀、位於中間、方向亦在中間，單莢重5.0公克，最低結莢高度10cm，莢梗易脫離，豆莢底色綠色、無斑紋色，嫩莢無花青素亦無莢頸、表面略粗糙、橫斷面呈扁平狀，嫩莢硬、纖維中等、肉淡綠色、厚0.2cm，嫩豆中等大小、長9cm、寬3.5cm、厚0.2cm、底色淡綠色，嫩豆亦無斑紋色，對銹病具抗性，對紅蜘蛛有中等抗性。

**引進日期：**78.8.26

**試種單位：**農業試驗所

鵲豆

**俗名：**鵲豆

**科名：**Leguminosae

**學名：***Dolichos lablab* L.

**品種：**老母豬耳朵（黑仁）

**用途：**嫩豆（或乾豆）

**特性：**種子長1.5cm、寬1.2cm、厚0.7cm、腎臟形，種皮無斑紋，種臍無環色，種皮底色黑色、光澤陰暗、脈紋不明顯，百粒種子重44公克，幼莖胚軸長、綠色，主莖節間長12cm，中等粗細，分枝性強，株高61cm以上、寬200cm，分枝開展型，小葉大小中等、長7cm、寬5cm、綠色、三角形，株型爲無限型蔓性，株勢粗大旺盛，花朵中等大小、花紅色或紫紅色，花序長度強，著莢性中等，小花梗長度0.5cm，每花序著莢數1莢，莢長10cm、寬2.0cm、厚0.3～0.4cm，豆莢稍曲，每莢種仁數5.2粒，莢尖長1.2cm、呈直狀、位於中間、方向亦在中間，單莢重12公克，最低結莢高度30cm，莢梗易脫離，豆莢底色淡綠色，豆莢無斑紋色，嫩莢無花青素，有莢頸，嫩莢橫斷面呈扁平狀，嫩莢硬、有筋絲、纖維多、肉質緻密、肉綠色、肉厚0.6cm，嫩豆大、長1.2公釐、寬0.9公釐、厚0.5公釐、底色淡綠色、無斑紋色，對銹病、紅蜘蛛皆有抗性。

**引進日期：**78.8.26

**試種單位：**農業試驗所

5837

鵲豆

**俗名：** 鵲豆

**科名：** Leguminosae

**學名：** *Dolichos lablab* (L.)

**品種：** 老母豬耳朵

**用途：** 主要為食用

**特性：** 種子為黑色，子葉至假子葉莖色為綠色，株性蔓性，莖粗，葉綠，側枝多，分枝強，第二次生長周期再生性中等，一花穗花數 11 ～ 20 朵，花紫色，花穗綠色，豆莢色白綠，背部綠色，腹部白色，易老化，無彎曲度，氣味弱，長日照發育良好，常開花結果，對疫病、白絹病、病毒病有抗性。

**引進日期：** 78.8.26

**試種單位：** 台中區農業改良場

**俗名：**架豆

**科名：** Leguminosae

**學名：** *Dolichos* spp.

**品種：**大姑娘甩袖

**用途：**食用

**特性：**蔓性無限型菜豆，花色白，葉色淺綠，結莢期中等，分枝極少，結莢少，中生種，產期短，產量低，極感銹病，種原無保存。

**引進日期：** 78.8.26

**試種單位：**台中改良場

**俗名：** 架豆

**科名：** Leguminosae

**學名：** *Dolichos* spp.

**品種：** 大姑娘甩袖

**用途：** 食用

**特性：** 種子長1.4cm、寬0.7cm、厚0.4cm、腎臟形，種皮底色褐色有白色斑紋，具光澤、脈紋不明顯，種臍環黃褐色，百粒種子重32公克，子葉大、長7cm、寬8cm、綠色，幼莖胚軸長、綠色，分枝性中等，莢厚1.2cm，豆莢稍曲，每莢種仁8粒，莢尖長0.8cm、直形、位於中間、方向向背部，最低結莢高度30cm，豆莢底色綠色、無斑紋色，嫩莢無花青素，有莢頸，株型無限蔓性，普通株勢，播種至開花日30天，開花至嫩莢採收日13天，第一花序著生在第8節，第一花序6朵，花白色中等大小，花序中等長度，著莢性中等，每花序著莢2～3莢，莢長13.3cm、寬1.2cm，嫩莢表面平滑，嫩豆中等大小、長1.4公釐、寬0.4公釐、厚0.3公釐、底色土黃色，嫩豆無斑紋色，剝實率爲90%以上，對紅蜘蛛有中等抗性。

**引進日期：** 78.8.26

**試種單位：** 農業試驗所

TVI 5830

四季豆

**俗名：**四季豆

**科名：**Leguminosae

**學名：***Phaseolus vulgaris* L.

**品種：**

**用途：**食用

**特性：**種子長1.4cm、寬0.7cm、厚0.4cm、腎臟形，種皮無斑紋，種皮底色褐色，種臍環黃褐色、光澤光亮、脈紋不明顯，百粒種子重29公克，子葉長7cm、寬7.5cm、綠色，幼莖胚軸長、綠色，分枝性弱，株高61cm以上、寬50～70cm，分枝直立型，小葉中等大小、長10cm、寬7～8cm、綠色、三角形，株型為有限型矮性，株勢細弱。播種至開花日25天，開花至嫩莢採收日15天，花白色，花序長3～4cm，著莢性弱，每花序著莢4～5莢，莢長11.2cm、寬度中等、厚0.8～1cm，豆莢稍曲，每莢種仁6粒，莢尖長0.3cm、呈稍曲狀、位於邊緣、向背部，單莢重10公克，最低結莢高度11cm，莢梗脫離性難，豆莢底色綠色、斑紋紅色，嫩莢無花青素、表面平滑、橫斷面呈卵狀，嫩莢稍軟、有筋絲、纖維中等、肉質疏鬆、肉淡綠色、肉厚0.8～1cm，嫩豆中等大小、長1.2cm、寬0.5cm、厚0.4cm、底色淡黃色、無斑紋色，剝實率低，對銹病具抗性。

**引進日期：**78.8.26

**試種單位：**農業試驗所

TVI 5833

# 四季豆

**俗名：**四季豆

**科名：**Leguminosae

**學名：***Phaseolus vulgaris* L.

**品種：**（農委77號）

**用途：**食用

**特性：**蔓性，無限型菜豆，葉色濃綠，花色白色，嫩莢濃綠，莢長17cm，單莢重約12公克，結莢少，分枝少，中生種，產量不如地方栽培種，極感銹病，種原無保存。

**引進日期：**78.8.26

**試種單位：**台中改良場

**俗名：**菜豆

**科名：**Leguminosae

**學名：***Phaseolus vulgaris*

**品種：**白雲豆

**用途：**食用

**特性：**蔓性，無限型菜豆，葉色濃綠，花白色，嫩莢濃綠，莢長16cm ，單莢重10公克，結莢性差，分枝極少，不適宜台灣栽培，種原無保存。

**引進日期：**78.8.26

**試種單位：**台中改良場

菜豆

**俗名：**菜豆

**科名：**Leguminosae

**學名：***Phaseolus vulgaris* L.

**品種：**白雲豆

**用途：**食用

**特性：**種子長1.4cm、寬0.8cm、厚0.5cm、腎臟形，種皮無斑紋、底色白色、光澤陰暗、脈紋不明顯，種臍無環色，百粒種子重33公克，子葉大、長6.5cm、寬7cm、綠色，幼莖胚軸長、綠色，主莖節數10節以上、節間長15cm，主莖細，分枝性弱，株高61cm以上，子葉小、長5cm、寬4.2cm、綠色，豆莢稍曲，每莢種仁6～7粒，莢尖長5cm、位於邊緣、方向在中間，最低結莢高度25～30cm，莢梗易脫離，嫩莢無花青素，有莢頸，小葉三角形，株型為有限型、矮性，株勢細弱，播種至開花日34天，開花至嫩莢採收日13天，花白色，花序長2～3cm，著莢性弱，小花梗長15cm，每花序著莢3～4莢，莢長12.7cm、寬度中等，嫩莢稍軟、有筋絲、表面平滑、橫斷面呈扁平狀，纖維少、肉厚0.7cm，嫩豆中等大小、長1.3cm、寬0.8cm、厚0.3cm、底色白色，嫩豆無斑紋色。

**引進日期：**78.8.26

**試種單位：**農業試驗所

TVI 5831

菜豆

**俗名：**菜豆

**科名：**Leguminosae

**學名：***Phaseolus vulgaris* L.

**品種：**綠雲豆

**用途：**食用

**特性：**種子長1.4cm、寬0.7cm、厚0.5cm、腎臟形，種皮無斑紋、底色褐色、光澤光亮、脈紋不明顯，種臍無環色，百粒種子重30公克，子葉大、長4cm、寬6.5cm、綠色，幼莖胚軸長、綠色，主莖細、節間長15cm，分枝性弱，株高61cm以上，子葉長5cm、寬4.2cm、綠色，莢厚1.1cm，豆莢彎曲，每莢種仁5粒，莢尖長1.1cm、形狀稍曲、位於邊緣、方向在中間，單莢重8公克，最低結莢高度20cm，豆莢無斑紋色、底色淡黃，嫩莢無花青素、有莢頸，小葉四稜形，株型爲無限型蔓性，株勢細弱，播種至開花日34天，開花至嫩莢採收日13天，開花至嫩豆採收日25天，第一花序著生在第5節，第一花序7朵，花朵小、白色，花序長度中等，小花梗長12cm，每花序著莢7莢，莢長14.2cm、寬度中等，嫩莢稍硬、有筋絲、表面平滑、橫斷面呈卵圓狀，纖維中等，嫩豆無斑紋色、底色淡黃色，耐寒性、耐濕性皆弱。

**引進日期：**78.8.26

**試種單位：**農業試驗所

TVI 5832

菜豆

**俗名：** 菜豆

**科名：** Leguminosae

**學名：** *Phaseolus vulgaris* L.

**品種：** 矮性菜豆 Anasazi Beans

**用途：** 食用

**特性：** 種子腎臟形，種皮底色白色，莢長91cm、寬1.2cm，每莢種仁4～5粒，播種至開花日36天，開花至嫩莢採收日42天，開花至嫩豆採收日14天，花白色，抗葉潛蠅。

**引進日期：** 78.10.5

**試種單位：** 農業試驗所

**俗名：**菜豆

**科名：** Leguminosae

**學名：** *Phaseolus vulgaris* L.

**品種：**綠雲豆

**用途：**食用

**特性：**蔓性，無限型菜豆，分枝少，花白色，嫩莢綠色，結莢少，莢長16.5cm，單莢重11公克，產量低，極感銹病，不適合本區栽培，種原無保存。

**引進日期：**78.8.26

**試種單位：**台中改良場

豌豆

**俗名：** 豌豆

**科名：** Leguminosae

**學名：** *Pisum sativum* L.

**品種：** 黑仁白臍（農委78號）

**用途：** 嫩莢供食用

**特性：** 種子中大、長1.6cm、寬0.7cm、厚0.4cm、腎臟形，千粒種子重31公克、底色黑色、斑點紫色，種臍白色，子葉綠色，主莖粗細0.3cm、節間長，豆苗莖部橫徑0.3cm，分枝數少，有小葉、淡綠色，葉面臘質少，株勢細弱，植株綠色，花紫紅色，花梗短，第一花序著生在第4～5節，每花序著莢1～2莢，莢長13.3cm、寬0.8cm、厚0.3～0.4cm，莢尖，莢形稍曲，莢面稍呈波浪狀彎曲，莢綠色，單莢輕，最低結莢高度15～17cm，每莢種仁6粒，莢梗不易脫離，莢蒂小，嫩莢無臘質，嫩莢種仁膨大速度快，嫩莢纖維中等、光澤強，嫩豆小、長0.3cm、寬0.2cm、厚0.2cm、橢圓球形、綠色；嫩豆百粒重輕，剝實率低。

**引進日期：** 78.8.26

**試種單位：** 農業試驗所

黑仁晚豆 5834

豌豆

**俗名：**豌豆

**科名：** Leguminosae

**學名：** *Pisum sativum* L.

**品種：**花仁豌豆(農委78號)

**用途：**嫩莢供食用

**特性：**種子中大、長1.4cm 、寬0.6cm 、厚0.5cm 、腎臟形，千粒種子重28公克、表面平滑、底色褐色、斑點黑色，種臍白色，子葉綠色、長6.5cm 、寬6.5cm ，上胚軸約0.5cm ，主莖粗約0.3cm 、節數25～30節、節間長，豆苗頸部橫徑0.3cm ，豆苗莖壁厚度中等，株高90～120cm ，下節位分枝，分枝數少，豆苗分枝快慢爲中等，小葉中等大小、4對以上、淡綠色，葉面臘質少，株勢細弱，植株綠色，花紫紅色，每一花序3花以上，花梗長短中等，每花序著莢1莢～2莢，莢淺綠色長12cm 、寬0.7～0.8cm 、厚0.6cm ，莢尖尖銳，莢形彎曲，莢面稍呈波浪狀彎曲，單莢重5～6公克，最低結莢高度21cm ，每莢種仁7～8粒，莢梗脫離性中等，莢蒂小，嫩莢有臘質、種仁膨大速度快、纖維少，嫩豆橢圓球形、灰白綠色。

**引進日期：**78.8.26

**試種單位：**農業試驗所

5835
2/10

豌豆

**俗名：**豌豆

**科名：**Leguminosae

**學名：***Pisum sativum* L.

**品種：**農委78號

**用途：**食用

**特性：**蔓性，無限型莢豆，分枝極少，中生種，花紫色，品種分離頗雜，莢色為綠或紫色相雜，肉質極厚，但產量低，銹病多為小病斑，種原無保存。

**引進日期：**78.8.26

**試種單位：**台中改良場

**俗名：**豇豆

**科名：** Leguminosae

**學名：** *Vigna* sesquipedalis W.F. Wight

**品種：**農委 79 號

**用途：**食用

**特性：**蔓性豇豆，分枝少，中生種，花紫色，嫩莢綠色，莢長約 60cm ，結莢性尚佳，惟秋作結實不良，每嫩莢約 3 ～ 5 粒種子不等，莢細而產量較地方品種（青皮黑仁）爲少，種原無保存。

**引進日期：** 78.8.26

**試種單位：**台中改良場

豇豆

**俗名：**豇豆

**科名：** Leguminosae

**學名：** *Vigna sesquipedalis* W. F. Wight

**品種：**（農委79號）

**用途：**食用

**特性：**種子長0.9cm 、寬0.5cm 、厚0.3cm 、腎臟形，種皮無斑紋，底色紅褐色，種臍環黑色，分枝性弱，播種至開花日26天，開花至嫩莢採收日20天，花紫色，莢長62.3cm 、寬0.7cm ，莢薄，嫩莢稍彎曲，對煤黴病具抗性。

**引進日期：** 78.8.26

**試種單位：**農業試驗所

TVI 5829

蓴菜

俗名：蓴菜

科名：Nymphaeaceae

學名：*Brasenia schreberi* J.F. Gmel.

品種：

用途：食用

特性：水生植物、株高60～80cm，株寬中等，葉綠色，葉姿半直立，葉片中等大小、葉數少，適應性中等，耐寒性、耐旱性皆弱，耐熱性、耐濕性皆強，葉圓形，葉面平滑，葉緣有缺刻，葉質柔嫩，葉柄長、紫色、厚薄與寬窄皆中等、形狀微凹。

引進日期：78.10.23

試種單位：農業試驗所



甜椒

**俗名：**甜椒

**科名：**Solanaceae

**學名：***Capsicum annuum* L.

**品種：**海豐1號

**用途：**食用

**特性：**種子淡黃色，千粒種子重6.0公克，葉柄短，株形半直立，分枝性中等，花朵中大、白色，花藥黃色，花梗長度中等，花萼緊繞，無雄不稔性，果姿向下，果上花青素易發生，未成熟、成熟果果色皆為綠色，果實縱切面呈梯形，橫切面呈四邊形，花梗連接處淺凹，果實尖鈍形，果面具光澤、亮且平滑。適收期二十果平均果重117.5公克，最大果重143公克，果長8.5cm 、寬6.7cm ，果肉厚5.1cm ，不具辣味，果面條溝淺，果皮質地微軟。

**引進日期：**81.7.28

**試種單位：**農業試驗所

92-880

# 大紅茄子

**俗名：**大紅茄子

**科名：**Solanaceae

**學名：***Solanum nelongena* L.

**品種：**大紅茄子

**用途：**主要爲食用

**特性：**種子中等大小，淡褐色，子葉小，胚軸白色，莖綠色，莖上有少許絨毛，葉片中等大小、綠色、表面無刺、葉下表面茸毛多，葉緣波浪狀，葉柄長度中等，葉片薄，盛花期株形半直立，分枝性弱，播種至開花日數約40天，開花至採收日數23天，第一朵雌花著生於第3節。每一花序開花3朵以上，花朵大、淡紫色，花柱短。每果位著1果，果形中長形，果頂部平滑，果底部尖，花痕部小，食用果果皮暗紫色，成熟果果皮暗橙色，果實彎曲度輕微，果面有光澤，果梗中等粗細，果長18公分、寬4～5公分。果蒂淺紫色、稍反轉，果蒂下無著色，果蒂大，果萼、果梗皆無刺，果皮質微軟，果肉白色、肉質口味中等。耐寒性、耐熱性、耐旱性、耐濕性皆爲中等，對病毒病、輪紋病、灰黴病、菌核病、苗立枯病之抗性皆爲中等，對青枯病、果疫病、萎凋病、蚜蟲、粉蝨、紅蜘蛛、浮塵子、番茄夜蛾、根瘤線蟲病之感染程度爲中等。

**引進日期：**78.10.26

**試種單位：**高雄改良場旗南分場

農委82號

農委82號

番茄

**俗名：** 番茄

**科名：** Solanaceae

**學名：** *Lycopersicon lycopersicum* (L.)

**品種：** 早豐

**用途：** 食用

**特性：** 種子直徑0.4cm、黃褐色，千粒種子重4.1公克。莖綠色，絨毛中等，節間長6cm，葉綠色、絨毛少，葉片中等大小、長8cm、寬4cm、平滑度中等，葉柄短，株形半直立型，綠收期株高70～80cm，紅收期株高80～90cm，節無紅色，株寬90～100cm，分枝性中等，花朵中大、黃白色，花冠無斑點，花藥黃色，花梗中長，花萼緊繞，無雄不稔性，成熟期中，著果集中於上位，果姿向下，每果位著果3果，果實在植株上的持久性爲久持型，果上花青素難發生，未成熟果淡綠色，成熟果紅色，果實縱切面心形，橫切面圓形，花梗連接處果形淺凹，果尖端爲尖形，果面有中度光澤，果面平滑、條溝淺，心室6室，果實不辣，果皮質軟，耐寒性中等，高溫結果力弱，耐旱性弱，耐濕性中等。

**引進日期：** 81.7.28

**試種單位：** 農業試驗所

TVI 7068

水仙

**俗名：**水仙

**科名：** Amaryllidaceae

**學名：** *Narcissus* spp.

**品種：**

**用途：**觀賞

**特性：**株高44.8cm，葉長41cm，葉寬0.8cm，多年生，以扦插方式繁殖，球莖直徑3cm。

**引進日期：** 79.2.2

**試種單位：**桃園改良場

棒果花

**俗名：**棒果花

**科名：** Asclepiadaceae

**學名：** *Asclepias fruticosa*

**品種：**

**用途：**切花或庭園樹

**特性：**爲多年生常綠灌木，株高2～3公尺。葉全緣，披針形，葉面平滑，紙質，有多對羽狀側脈。枝上佈毛茸。除夏季外全年可開花，花白色、單瓣、繖型花序、腋生，每花序可開10～15朵花，花徑0.5～0.8公分。果實球型、綠色，長7～10cm、寬5～8cm，表面密生軟刺。種子米粒型、黑褐色，以種子及扦插方式繁殖。

**引進日期：** 70.3.31

**試種單位：**桃園改良場

**俗名：** 非洲紫葳

**科名：** Bignoniaceae

**學名：** *Jacaranda acutifalia* Humb. et Bonpl.

**品種：**（實生苗）

**用途：** 觀賞用及行道樹

**特性：** 多年生常綠喬木，樹型高大。葉爲偶數羽狀複葉，對生，綠色，葉背淡綠色。花爲總狀花序著生於枝條先端，花冠筒狀，紫藍色，盛開時甚於美觀。以種子或扦插方式繁殖。

**引進日期：** 70.3.31

**試種單位：** 農業試驗所

非洲紫葳
(藍花楹)

# 南天竹

**俗名：** 南天竹

**科名：** Nandinaceae

**學名：** *Nandina domestica*

**品種：**

**用途：** 切花、盆花、庭園樹

**特性：** 常綠，株高2～3m，葉型為橢圓狀披針形，花期5～7月，花白色，花序有圓錐花序及總狀花序，腋生。結果期一般在8～10月，果實球形，直徑0.6～0.7cm，朱紅色。繁殖方式以種子播種、扦插、分株及嫁接均可，適種期在二～四月。

**引進日期：** 70.3.31

**試種單位：** 農業試驗所

南天竹

紅松

**俗名：**紅松

**科名：** Pinaceae

**學名：** *Pinus koraiensis* sieb. et Zucc.

**品種：**（實生苗）

**用途：**傢俱木材

**特性：**紅松來自大陸高冷地區，本省氣候不宜生長。曾於本省中部多處高山試植，皆難渡夏日高溫，相繼枯死。圖爲在台北溫室使用穴植管育苗及烏石坑(1000m)苗圃以塑膠袋育苗之生長情形。

**引進日期：** 76.11.24

**試種單位：**林業試驗所

▲紅松育苗(穴植管)

▲紅松3年生

# 蔣資政彥士歷年引進作物種原一覽表

| 種　　類 | 引進日期 | 數　　量 | 試　種　單　位 | 現　　況 |
|---|---|---|---|---|
| 楊　　梅 | 67.6.6 | 種子323粒 | 種苗繁殖場 | 1.目前種植於本場第一農場內，成株共18株，平均株高約4公尺，其中7棵雌株結果。每株產量約15公斤，最大單果種15公克，每年三月開花，五月成熟，雄株開花但不結果。<br>2.結果株於冬夏二季行修剪矮化，結果期紗網保護。<br>3.果實採收處理費工且易損傷，保鮮不易，遇雨易腐爛。<br>4.目前正繼續栽培觀察中。 |
| 櫻　　桃 | 67.8.4 | 種子200粒 | 台大園藝系 | 成活率差，均已死亡 |
| 梅<br>（農發一號） | 68.9.20 | 種子330粒 | 台大園藝系 | 成活率差，均已死亡 |
| | | | 興大園藝系 | 播種，但全部不發芽 |
| | | | 退輔會福壽山農場 | 播種未發芽 |
| 哈　密　瓜<br>（農發四號） | 68.10.8 | 種子42粒 | 鳳山分所 | 生育不良，不抗病 |
| | | | 台南農改場 | 生育及著果均不良，暫時保存 |
| 鴨　　梨 | 69.7.14 | 接穗10枝 | 退輔會福壽山農場 | 高接於品種觀察區，現有高接枝53枝，枝長平均195公分，樹勢旺，枝易下垂，三月下旬開花，果倒卵形，青綠色，重100-150公克，細脆多汁。 |
| | | | 退輔會武陵農場 | 1.果樹生育：本年新梢平均伸長約35公分，易發生隔年結果現象，抗病力中等。<br>2.果實品質：果肉白色細緻，水份多，甜脆，糖度約14-16度，果心小，平均單果重約150公克。<br>3.現有高接枝條16枝高接於本場果四區好本梨樹，八十三年度配合繁殖計畫，嫁接苗木100株，已於八十三年二月完成嫁接作業。 |

| 種　　類 | 引進日期 | 數　　量 | 試　種　單　位 | 現　　況 |
|---|---|---|---|---|
| 雪　花　梨 | 69.7.14 | 接穗10枝 | 退輔會福壽山農場 | 果型嫌小，重120公克左右，果心大，肉質粗，當作種原保存。 |
| | | | 退輔會武陵農場 | 1.果樹生育：現有接穗數共六枝，本年新梢平均伸長約23公分，抗病力中等。<br>2.果實品質：果肉白色，質脆，糖度約12-14度，果心大，石細胞多且粗，平均單果重約170公克。<br>3.本品種之果實外觀粗糙，石細胞多且粗。 |
| 河南雞心棗 | 69.7.14 | 種子30粒 | 福壽山農場 | 全部未發芽 |
| 河南庄棗 | 69.7.14 | 種子32粒 | 福壽山農場 | 全部未發芽 |
| 杜　　梨 | 69.7.14 | 種子1小罐 | 福壽山農場 | 發芽20株後陸續死亡 |
| 丁香(印尼) | 70.3.12 | 種子1小袋 | 嘉義分所 | 發芽後全部死亡 |
| 非洲紫葳 | 70.3.31 | 種子一包 | 農試所園藝系 | 樹勢旺盛，生長良好，五月起開花，花為藍色，樹高約2.5公尺，共11株，種植於本所植病系館後。 |
| 棒　果　花 | 70.3.31 | 種子一包 | 農試所園藝系 | 缺乏實用價值，種原已遺失 |
| | | | 桃園農改場(三重分場) | 經栽種發現該植物極適合本省氣候，並已推廣農民種植為切花花材，七十六年以後本場僅保存種子，而未每年種植，目前花市均可購得該植物之切花枝條。 |
| 南　天　竹 | 70.3.31 | 種子一包 | 農試所園藝系 | 結果為紅色，似狀元紅，樹高約為2公尺，共20株，種植於本所花卉苗圃。 |
| 麻葉繡球 | 70.3.31 | 種子一包 | 農試所園藝系 | 已死亡。 |
| 銀　　樺 | 70.3.31 | 種子一包 | 農試所園藝系 | 75年8月受韋恩颱風吹倒枯死 |
| 繭　絲　樹 | 70.3.31 | 種子一包 | 農試所園藝系 | 75年8月受韋恩颱風吹倒枯死 |
| 蛇　皮　果 | 70.5.25 | 種子13枚 | 鳳山園試分所 | 現存活8株，種植於鳳山分所試驗區，平均株高雌株約3公尺，雄株約2.5公尺，雌株葉片數平均12枚，莖粗約22公 |

| 種　　類 | 引進日期 | 數　　量 | 試　種　單　位 | 現　　況 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 分，開張度約270公分，花穗平均1穗，已結果實，觀察果實外觀似非蛇皮果；雄株葉片數平均11枚，莖粗約12公分，開張度約110公分。 |
| 木　　瓜 | 70.5.31 | 種子四包（四品系） | 嘉義分所 | 因病已死亡 |
| | | | 鳳山分所 | C1,C30,C60均未發芽；C-28無利用價值且感染病毒病嚴重而淘汰。 |
| 水　蜜　桃 | 70.8.22 | 種子20粒 | 台大山地農場 | 營養生長好，但結果不穩定，結實甚少。 |
| 馬　米　吉 | 70.9.11 | 種子7粒 | 嘉義分所 | 未發芽 |
| | | | 鳳山分所 | 未發芽 |
| Mamay（厄瓜多） | 70.9.11 | 種子7顆 | 嘉義分所 | 未發芽 |
| | | | 鳳山分所 | 未發芽 |
| 天津鴨梨 | 70.12.22 | 種子1小袋 | 台大園藝系 | 發芽6株後陸續死亡。 |
| 北平鴨梨 | 71.1.22 | 種子15粒 | 台大園藝系 | 發芽1株後死亡。 |
| 河南靈寶圓棗 | 71.1.26 | 種子1袋約40粒 | 台大園藝系 | 種子情況不佳，以組織培養促進發芽仍未成功。 |
| 山東肥桃 | 71.2.16 | 接穗5枝 | 台大山地實驗農場 | 營養生長良好，樹勢碩壯，但開花與結實不正常，迄無成熟果實收穫，保存4株，平均株高2公尺。種植於梅峰農場。 |
| 哈　密　瓜 | 71.2.28 | 種子1小罐 | 台南農改場 | Honey Dew型，莖蔓細，發育快，著果早，著果力強，晚熟，橢圓，皮光滑，肉淡綠色，品種已保存。 |
| 柑　　桔 | 71.5.24 | 苗木6株 | 農試所園藝系 | 苗木根部暴露太久，葉片已枯黃種植後均未成活。 |
| 番　石　榴 | 71.5.25 | 種子2小袋（二品種） | 嘉義農試分所 | 試種結果，缺乏實用價值，已停止試作。種原無保存。 |
| 蜜　　柑 | 71.6.24 | 苗木30株 | 農試所園藝系 | 未成活 |
| 枳　　殼 | 71.6.24 | 苗木9株 | 農試所園藝系 | 未成活 |
| 丁　　香 | 71.10.18 | 種子約100粒 | 鳳山園試分所 | 不適應氣候，已死亡。 |
| 豆　　蔻 | 71.10.18 | 種子約80粒 | 嘉義分所 | 播種成活4株，因不耐低溫已死亡。 |
| 梨 | 72.2.9 | 種子約40粒 | 台大園藝系 | 均未發芽 |

| 種　　類 | 引進日期 | 數　　量 | 試種單位 | 現　　況 |
|---|---|---|---|---|
| 冷子番荔枝 | 72.5.21 | 種子140粒 | 嘉義農試分所 | 試種結果，缺乏實用價值，但當作種原保存。 |
| | | | 台中農改場 | 該品種具徒長性，無法適應本場(位於彰化平均)氣候，經多次颱風過後，多數被吹斷及淹死，至今僅剩三株，株高約3公尺，擬不繼續進行觀察試驗。 |
| 柑　　桔 | 72.6.11 | 種子5粒 | 農試所園藝系 | 種子已乾枯，無法萌芽。 |
| 荔　　枝 | 72.7.22 | 種子2小包 | 嘉義分所 | 所送品種均為小核種播種後均不發芽。 |
| | | | 鳳山分所 | 未發芽 |
| 哈密瓜(農發22號) | 72.10.24 | 種子685粒 | 農試所園藝系 | 生長勢弱，著果差，果橄欖形，800~1000公克，肉厚，質脆，肉色鮭紅，現為哈密瓜系統親本之一。 |
| | | | 台南農改場 | 生育及著果不良，無利用價值，暫時保存。 |
| | | | 台中農改場 | 無利用價值，未再試種。 |
| | | | 桃園農改場 | 73年4月12日於桃園縣大園鄉種植，7月採收，生育情形不良，果實品質差，平均果實重1.98公斤，糖度8.1 Brix。 |
| | | | 農友種苗公司 | 生育強，植株中大，易結果，易裂果，果肉薄脆·耐病性弱，晚生，果型不整齊果實糖度約5度，無經濟價值。 |
| 哈密瓜(農發30號) | 72.12.8 | 種子1包 | 農友種苗公司 | 生育甚強，植株特大，不易結果，不易裂果，果實大，果肉薄，果硬耐貯運，晚生，抗病性弱，果實糖度約4.5度，品質低劣，完全無經濟價值。 |
| 柑　　桔 | 72.12.9 | 種子2粒 | 農試所園藝系 | 未發芽 |
| 梨 | 72.12.10 | 種子5粒 | 台大山地實驗農場 | 樹勢生長良好，已開始開花結果，擬於新年度內開始果實品質調查，尚保存2株，未推廣，平均株高4-5公尺。種植於梅峰農場。 |
| 蕁　　菜 | 73.4.2 | 匍匐蔓5小段 | 農試所園藝系 | 應為金銀菜，種原已因福壽螺危害死亡。 |
| 楊　　梅 | 73.4.2 | 苗木6株 | 農試所園藝系 | 成活率差已陸續死亡。 |
| 柿　　子 | 73.4.3 | 種子15粒 | 農試所園藝系 | 全部成活，平均株高2.8公尺，定植本所品種保存園。 |

| 種　類 | 引進日期 | 數　量 | 試種單位 | 現　況 |
|---|---|---|---|---|
| 梨 | 73.4.4 | 小苗5株 | 台大山地實驗農場 | 樹勢生長良好，已開始開花結實，擬於新年度內開始果實品質調查，尚保存2株，未推廣，平均株高4公尺。種植於梅峰農場。 |
| 杏 | 73.8.17 | 種子12粒 | 台大山地實驗農場 | 樹勢生長旺盛，有開花，但為數甚少，有防雨設施下，果實生長良好，惟甚酸，當標本保存8株，未推廣，平均株高2.5公尺。種植於梅峰農場。 |
| 櫻　桃 | 73.8.17 | 種子30粒 | 農試所園藝系 | |
| 冬甜瓜 | 73.10.1 | 種子2小袋 | 農試所園藝系 | 已成為本所甜瓜育種材料，目前仍在選育中。 |
| 李　子 | 73.10.16 | 種子12粒 | 台大山地實驗農場 | 部分為乾果李(prune)營養生長勢旺，主幹性強，已略見結果，其中有一株結實甚多，尚保存14株，平均株高2.5公尺，種植於梅峰農場。 |
| 甜　瓜 | 73.10.16 | 種子1包 | 農試所園藝系 | 已成為本所甜瓜育種材料，目前仍在選育中。 |
| 芒　果 | 73.10.22 | 種子3枚 | 農試所園藝系 | |
| 廣西紅柚 | 73.12.19 | 種子3小袋(三品系) | 農試所園藝系 | 苗12株，平均株高約1公尺，種植於關西工作站，生育良好，但未開花結果。 |
| | | | 嘉義農試分所 | 1.三品系播種成活30株，盆栽苗木，置於溪口網室，目前生長良好，未開花，平株株高約130公分。並已嫁接繁殖。<br>2.目前仍繼續栽培觀察中。 |
| 馬蘭頭 | 73.12.31 | 種子1包 | 農試所園藝系 | 缺乏實用價值，供為蔬菜種原保存。 |
| 野薺菜 | 73.12.31 | 種子1包 | 農試所園藝系 | 植株高約10公分，易老化，食用價值不高，已採收種子。 |
| 香　梨 | 74.1.8 | 種子7粒 | 台大山地實驗農場 | 營養生長良好，直立性，樹冠緊湊(compact canopy)，平均株高2.5公尺，尚保存4株，尚未見有結實。種植於梅峰農場。 |

| 種　類 | 引進日期 | 數　量 | 試種單位 | 現　況 |
|---|---|---|---|---|
| 胡　瓜 | 74.3.16 | 種子11包 | 農試所園藝系 | 試種結果缺乏實用價值，供爲疏菜種原保存。 |
| | | | 台南農改場 | 本場分配6包，目前僅Honey Dew一品種種植，生長勢中等，發育緩，分枝多，著果早，著果力強，晚熟，橢圓，果大，皮光滑與本場選育HG5-1-4-6-1-1雜交試種中。 |
| 花菱草 | 74.4.1 | 種子2包 | 農試所園藝系 | 種子活力已降低，致種原遺失。 |
| 李 | 74.8.22 | 種子6粒 | 台大山地實驗農場 | (與73年10月16日引入者併同保存觀察。) |
| 杏 | 74.8.22 | 種子5粒 | 台大山地實驗農場 | (與73年8月17日引入者併同保存調查。) |
| 回回豆 | 74.9.4 | 種子2包 | 鳳山園試分所 | 不適應氣候，已淘汰，停止試作。 |
| 水蜜桃 | 74.9.17 | 種子16粒 | 台大山地實驗農場 | 種原於移植時散失。 |
| 杏 | 74.9.17 | 種子10粒 | 台大山地實驗農場 | (與73年8月17日引入者併同保存調查。) |
| 南　瓜<br>(麵條瓜) | 74.10.3 | 種子2包 | 農試所園藝系 | 易罹患病蟲害，已停止試作，僅供爲蔬菜種原保存。 |
| | | | 農友種苗公司 | 1. 1987年自法國引進之Blanche de Virginie之純化系統交配，育成$F_1$品種。<br>2. 1989年命名「白秋」發表推廣中，但因台灣此種南瓜之食用習慣不多，推廣成績不理想。計劃今後在大陸試行推廣。 |
| 甜　瓜 | 74.10.3 | 種子3包 | 台南農改場 | 目前僅哈蜜瓜NO.1一品種種植，生長勢強，著果良好，長橢圓，果大型，有網紋細疏，皮淡黃，肉淡粉紅色，質脆，糖度高，易罹蔓枯病，已導入抗蔓枯病因子，回交選拔至BC。 |
| 江蘇碭山梨 | 74.11.2 | 種子25粒 | 台大山地實驗農場 | 營養生長良好，開花結實正常，結果良好，擬今年度進行果實品質調查，保存6株，平均株高6-7公尺，種植於梅峰農場。 |

| 種類 | 引進日期 | 數量 | 試種單位 | 現況 |
|---|---|---|---|---|
| 蘋果 | 74.12.31 | 種子100粒 | 農試所園藝系 | 定植羅娜保存園4株，高度約2公尺。本所果園10株，高度約1.7公尺，目前已部分作爲砧木用，未開花結果。 |
| 蘋果 | 75.1.20 | 枝條100枝(10品種) | 台大山地實驗農場 | 係爲觀賞開花之品種，嫁接於EM7號砧木，生長觀察中，開花正常，其色鮮紅甚美，保存20株，種植於梅峰農場庭園中，平均株高1-2公尺。 |
| 雪花梨 | 75.2.4 | 種子4粒 | 農試所園藝系 | 羅娜保存園一株約70公分高，生育不佳。 |
| 北京鴨梨 | 75.2.4 | 種子4粒 | 農試所園藝系 | 已罹病死亡 |
| 非洲星蘋果 | 75.2.12 | 種子15粒 | 台大園藝系 | 種子發芽後未成活已死亡 |
| | | | 鳳山分所 | 未成活 |
| 獼猴桃 | 75.2.26 | 苗木484株 | 花蓮農改場 | 試種結果，對本項作物已初步探討得知其生育習性，惟因缺乏實用價值，設置在農民之試作圃，已在民國81年、82年相繼廢園。 |
| | | | 桃園農改場 | 根據歷年試驗結果，Hayward較適宜高海拔地區種植，Bruno, Monty則中海拔處尚可栽培，至於平地則不宜栽植。目前移植本場五峰工作站，計有Hayward 76株以及Monty, Bruno各2株，以棚架栽培，因海拔1000公尺冬季低溫稍嫌不足，故結果量不高，每株約結果110粒，目前仍繼續栽培觀察。 |
| 藍莓 | 75.2.26 | 苗木450株 | 花蓮農改場 | 海拔1,500公尺試作圃，生育較好，Homebell品種表現較佳，花期長(5-10月)，果實小，深紫色，單粒果重約1公克，海拔500公尺試作圃，生育不良。 |

| 種類 | 引進日期 | 數量 | 試種單位 | 現況 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 台中農改場 | 生長勢弱，已逐漸枯死，存活率低，適應性差。 |
| 柑桔 | 75.3.6 | 種子14粒 | 農試所園藝系 | 種胚腐爛死亡 |
| 新彊香梨 | 75.3.12 | 果實2枚<br>種子5粒 | 台大山地實驗農場 | (併同74年1月8日引入者，觀察調查中。) |
| 日本梨「新雪」 | 75.3.25 | 種子7粒 | 台大山地實驗農場 | 種原於移植時散失。 |
| 非洲星蘋果 | 75.3.28 | 種子65粒 | 嘉義農試分所 | 1.應為″白柿″ Casimirca edulis。<br>2.已於76年定植3株嘉義分所果園，目前平均株高約7.5公尺，生長樹勢中等。<br>3.易受介殼蟲為害，目前已開花結果。<br>4.果實口味佳且加工利用性高，但在栽培上需注意果實蠅的防患及結果實缺鎂症的預防。目前仍繼續栽培觀察中。 |
| 樹番茄 | 75.5.7 | 種子59粒 | 種苗場 | 部分移台東區農改場，留在種苗場部分於生育期中陸續感染疫病，萎凋枯死。 |
| 刺番荔枝 | 75.5.12 | 種子64粒 | 鳳山園試分所 | 2株，種植於分所內，平均株高約1.5公尺，生長中，未開花。 |
| | | | 嘉義農試分所 | 1.已於77年7月定植37株，生長發育良好。<br>2.78年11月部分植株開始開花結果。<br>3.目前植株正常開花結果，平均株高約6公尺。<br>4.果實品質不錯且風土適應性良好，但要注意根系較弱的問題。<br>5.目前仍繼續於嘉義分所果園內栽培觀察中。 |
| 牛心梨 | 75.5.12 | 種子34粒 | 鳳山園試分所 | 1株，種植於標本園中，尚未開花，株高約190公分。 |

| 種　　類 | 引進日期 | 數　　量 | 試 種 單 位 | 現　　況 |
|---|---|---|---|---|
| 牛 心 梨 | 75.5.12 | | 嘉義農試分所 | 1. 應爲〃紫番荔枝〃Annona purpurea。<br>2.於76年12月定植2株，目前植株發育旺盛，樹勢開張且分株多，在79年底開少許花，但數量不多。<br>3.本年度開花茂盛，但仍未結果，平均株高約7.4公尺，有待進一步研究。<br>4.目前仍繼續於嘉義分所果園栽培觀察中。 |
| 牛 心 梨 | 75.6.9 | 種子40粒 | 嘉義農試分所 | 1. 應爲〃瓣立樓林果〃Rollinia mucosa。<br>2.於76年7月定植24株生長旺盛，唯植株高大，且枝條脆易斷，根群不多，易受風害。<br>3. 77年3月開始開花，可週年開花，同時於每年9月至12月間陸續成熟，目前平均株高約6.4公尺。<br>4.果肉灰色半透明帶粘性味淡甜，風味特殊，香氣濃郁，有人喜歡吃，卻有人不敢領教。<br>5.取種子繁殖後，已再定植18株(79年10月)，並在80年3月大量種植，經選種已淘汰部分植株。<br>6.在嘉義地區生育旺盛，果實產量高，且容易栽培。<br>7.目前仍繼續於嘉義分所果園栽培觀察中。 |
| 荔　　枝<br>「糯米糍」 | 75.7.25 | 種子60粒 | 農試所園藝系 | 未萌芽 |
| 甜　　瓜 | 75.8.29 | NO.1 | 農試所園藝系 | 東風甜瓜，已成爲本所甜瓜育種材料，目前仍在選育中 |
| 甜　　瓜 | 75.8.29 | NO.2 | 農試所園藝系 | 東風甜瓜，已成爲本所甜瓜育種材料，目前仍在選育中 |
| 哈 密 瓜 | 75.9.15 | 種子150粒 | 農試所園藝系 | 已成爲甜瓜育種材料，目前仍在選育中。 |

| 種　　類 | 引進日期 | 數　　量 | 試　種　單　位 | 現　　況 |
|---|---|---|---|---|
| HORCHATA | 75.11.17 | 種球16枚 | 農試所園藝系 | 初期生育尚可，形似牧草，後期發現有病害感染種球腐爛。 |
| 巴　梨 | 75.12.10 | 種子9粒 | 農試所園藝系 | 植株2株，已死亡。 |
| 桃 | 76.1.10 | 種子29粒 | 農試所園藝系 | 在平均無法開花，現在植株共21株，平均株高2.5公尺，已移羅娜。 |
| 無花果 | 76.8.19 | 苗木2株 | 嘉義農試分所 | 試種結果，缺乏實用價值，但當作種原保存。 |
| 李 | 76.8.19 | 種子57粒 | 農試所園藝系 | 定植羅娜品種保存園21株，高度由0.5公尺至2公尺，生育差異大果品不佳。 |
| | | | 嘉義農試分所 | 定植後卻於81年度遭颱風為害，種原已死。 |
| 介壽果 | 76.8.19 | 種子4粒 | 農試所園藝系 | 未萌芽。 |
| 磁石植物 | 76.8.19 | 種子4粒 | 農試所園藝系 | 未萌芽。 |
| 巴西棕梠 | 76.8.19 | 種子53粒 | 農試所園藝系 | 未萌芽。 |
| 胡椒 Piment De Cheiro | 76.8.19 | 種子80粒 | 農試所園藝系 | 不發芽。 |
| 大西番蓮 | 76.8.19 | 果實2個 | 農試所園藝系 | 未萌芽。 |
| 胡椒 Piment Malagueta | 76.8.19 | 種子51粒 | 農試所園藝系 | 不發芽。 |
| Kumaru | 76.8.19 | 種子6粒 | 農試所園藝系 | 未萌芽。 |
| Arnaja | 76.8.19 | 種子2粒 | 農試所園藝系 | 未萌芽。 |
| Angeroba | 76.8.19 | 種子3粒 | 農試所園藝系 | 未萌芽。 |
| Tocomar | 76.8.19 | 種子4粒 | 農試所園藝系 | 未萌芽。 |
| Ouci | 76.8.19 | 種子3粒 | 農試所園藝系 | 未萌芽。 |
| Kobaacu | 76.8.19 | 種子37粒 | 農試所園藝系 | 未萌芽。 |
| 加州哈密瓜 | 76.11.19 | 種子540粒 | 農試所園藝系 | 已為本所甜瓜育種材料，目前仍在選育中。 |
| | | | 台南改良場 | Honey Dew型，生長勢稍弱，株形較小，著果早，果橢圓，皮光滑，肉綠色，品種已保存。 |

| 種類 | 引進日期 | 數量 | 試種單位 | 現況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 紅松 | 76.11.24 | 種子2包 | 林試所育林系 | 本省氣候不宜生長，現存2株，缽植於佳陽，3年生苗高僅12公分。 |
| 天津鴨梨 | 76.11.24 | 種子5粒 | 農試所園藝系 | 未萌芽 |
| 西洋梨(巴梨) | 76.11.27 | 種子4粒 | 農試所園藝系 | 定植羅娜保存園，適應不佳而死亡。(低溫需求高) |
| 美洲胡桃 | 76.11.27 | 種子147粒 | 農試所園藝系 | 定植羅娜品種保存園27株，高約1.5公尺，生育中等，未開花結果。 |
| 新彊香梨 | 76.12.30 | 種子75粒 | 農試所園藝系 | 本批苗木定植羅娜品種保存園，因管理不善，已死亡。 |
| 蘋果 | 76.12.30 | 種子8粒 | 農試所園藝系 | 苗5株，於本所苗圃，高約1.5公尺，未開花結果。 |
| 鵝蛋柑 | 76.12.30 | 種子36粒 | 農試所園藝系 | 苗6株，平均株高約1公尺，種植於關西工作站，生育良好，但未開花結果。 |
| 四川橙 | 76.12.30 | 種子19粒 | 農試所園藝系 | 苗7株，平均株高約1公尺，種植於關西工作站，生育良好，但未開花結果。 |
| 安谷柚子 | 76.12.30 | 種子26粒 | 農試所園藝系 | 苗6株，平均株高約1公尺，種植於關西工作站，生育良好，但未開花結果。 |
| 蓬溪柚子 | 76.12.30 | 種子20粒 | 農試所園藝系 | 苗6株，平均株高約1公尺，種植於關西工作站，生育良好，但未開花結果。 |
| 川柚(甲) | 76.12.30 | 種子39粒 | 農試所園藝系 | 苗6株，平均株高約1公尺，種植於關西工作站，生育良好，但未開花結果。 |
| 川柚(乙) | 76.12.30 | 種子37粒 | 農試所園藝系 | 苗6株，平均株高約1公尺，種植於關西工作站，生育良好，但未開花結果。 |
| 柿子 | 76.12.31 | 種子24粒 | 農試所園藝系 | 苗6株，已二株開花，平均株高2.5公尺，定植於本所保存園。 |
| 福橘 | 76.12.31 | 種子41粒 | 農試所園藝系 | 苗6株，生育良好，平均株高0.5-1公尺，種植於關西工作站，未開花結果。 |

| 種　　類 | 引進日期 | 數　　量 | 試種單位 | 現　　況 |
|---|---|---|---|---|
| 梨 | 76.12.31 | 種子9粒 | 農試所園藝系 | 本所苗圃2株，高約1.5公尺，未開花結果。 |
| 泰國茄（鳳果） | 76.12.31 | 種子4粒 | 農試所園藝系 | 未萌芽 |
| 南瓜(農委70號) | 77.5.11 | 種子21粒 | 農試所園藝系 | 試種結果，易罹患病蟲害，已停止試作，目前已留種子保存。 |
| 蘿蔔（山東紅蘿蔔） | 78.1.20 | 種子90公克 | 桃園改良場 | 經本場七十八年一月及九月試種結果，根形不整齊、根皮紫色、肉白色，根重平均390 克。經選拔優良根形採種無法結莢，故本場已結束此引種試種。 |
| 新高梨 | 78.1.28（旅日僑領劉秀忍女士贈） | 苗木300株 | 農試所園藝系 | 定植羅娜品種保存園62株，生育不佳，株高約1公尺。 |
| | | 苗木200株 | 台大山地實驗農場 | 分防雨設施內與露地兩種環境下種植，已開花結果。設施內生長較露地良好，惟結果率並不高，設施內保存60株，露地140株，平均株高2-3公尺，種植於梅峰農場。 |
| | | 苗木1,050株 | 退輔會福壽山農場 | 種植於本場及各莊，現有513株，樹勢弱，強剪後漸恢復，平均株高269公分，新梢平均57公分，尚未開花結果(79年3月定植)，仍在繼續觀察中。 |
| | | 苗木100株 | 退輔會清境農場 | 定植本場已四年，成活80株，平均株高約2公尺，生長良好，部分結果1-2個，肉質比長十郎粗，水份多，果實大，品質、香味比横山梨佳，惟樹齡尚小，結果量尚待觀察。 |

| 種　類 | 引進日期 | 數　量 | 試種單位 | 現　況 |
|---|---|---|---|---|
| | | 苗木50株 | 退輔會花蓮農場 | 生長不良，不適應本地氣候，缺乏實用價值，已停止試作。 |
| | | 苗木300株 | 退輔會武陵農場 | 1.本場於79年3月取得果苗300株，除保留70株外，餘230株分發本場場員種植，現經調查存活數205株，現已有部分開花結果。<br>2.果樹生長情形：葉片濃綠，枝幹深褐色，生長勢強，本年期新梢伸長25-40公分，平均伸長約30公分。<br>3.果實性狀及品質：<br>(1)高接部份：八十年二月高接於新世紀及廿世紀梨各五株，於八十二年已開花結果，開花時可能與該兩品種授粉，果實形狀類似新世紀及廿世紀梨，但較長形，果肉質地細、甜脆，石細胞較少，品質佳，著果率亦高，單果重約180公克，甜度約15度。<br>(2)果苗定植部分：八十二年亦開花結果，唯因樹齡小每株僅保留3-10粒果，果實形狀不似高接者圓，果皮亦較深褐色，果肉質地脆，石細胞略多，著果率亦高，單果重約爲200公克，甜度14度，爲第一次結果，果實品質有待繼續觀察，現仍繼續觀察管理中。<br>4.新高梨定植地點、株數及平均株高：本場直營果六區65株，場墾員果園140株，平均株高約1.8公尺。 |

| 種　　類 | 引進日期 | 數　　量 | 試種單位 | 現　　況 |
|---|---|---|---|---|
| 福州紅橘 | 78.3.9 | 苗木3株 | 嘉義農試分所 | 1.苗木3株全部成活，發育極優，2株已結實。<br>2.目前仍以盆栽方式保存在嘉義分所網室，平均株高70公分，準備定植。<br>3.目前仍繼續栽培觀察中。 |
| Gentiana acaulis | 78.4.21 | 種子1小袋 | 農試所園藝系 | 未萌芽 |
| Leontopo-dium alpinum | 78.4.21 | 種子1小袋 | 農試所園藝系 | 未萌芽 |
| 洋　香　瓜 | 78.4.22 | 種子2000粒 | 鳳山園試分所 | 春作生育最佳，果實具網紋，果重約1,800公克，糖度14.3度。保存種子500粒。 |
| 老母豬耳朵(農委74號) | 78.8.26 | 種子1小袋 | 農試所園藝系另有台中場(3品系) | 試種結果，缺乏實用價值，目前已繁殖種子保存。 |
| 綠雲豆(農委75號) | 78.8.26 | 種子1小袋 | 台中改良場 | 蔓性、無限型、白花、分枝少、產量低、不適合本區栽培，已不繼續進行觀察試驗，種原無保存。 |
| | | | 農試所園藝系 | 已當作蔬菜種原保存。 |
| 白　雲　豆(農委76號) | 78.8.26 | 種子1小袋 | 農試所園藝系 | 已當作蔬菜種原保存。 |
| | | | 台中改良場 | 蔓性菜豆、花白色、結莢性差、分枝極少，已不繼續辦理試驗，種原無保存。 |
| 四　季　豆(農委77號) | 78.8.26 | 種子1小袋 | 台中改良場 | 蔓性、無限型、結莢型、產量皆不如地方栽培種，極感鏽病，已不繼續試驗觀察，種原無保存。 |
| | | | 農試所園藝系 | 易罹患病蟲害，已當蔬菜種原保存。 |
| 架豆(大姑娘甩柚) | 78.8.26 | 種子1小袋 | 農試所園藝系 | 試種結果，缺乏實用價值，已當蔬菜種原保存。 |
| 豌　　豆(農委78號) | 78.8.26 | 種子1小袋 | 台中改良場 | 蔓性菜豆、無限型、分枝少、紫花、產量低、短莢、鏽病多爲小病斑，無推廣價值，已不繼續試驗觀察，種原無保存。 |

| 種類 | 引進日期 | 數量 | 試種單位 | 現況 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 農試所園藝系 | 試種結果，缺乏實用價值，已當蔬菜種原保存。 |
| 豇豆(農委79號) | 78.8.26 | 種子1小袋 | 農試所園藝系 | 已成為本所豇豆抗病毒病育種材料，現仍在選育中。 |
| | | | 台中改良場 | 蔓性豇豆、分枝少，花紫色、莢小而產量較地方品種(青皮黑仁)為少，已不繼續辦理試驗，種原無保存。 |
| 結球白菜(早生50日) | 78.9.21 | 種子2小袋 | 桃園改良場 | 經本場七十八年十月、十一月及七十九年一月三個時期試驗結果，王將不適宜本省栽培，而早生五十日，適宜本省春作種植(一月十八日種植者產量高達 6481 公斤／0.1 公頃) 產量高，品質不佳，因種子不能自行留種，沒有繼續種植。 |
| 結球白菜(王將白菜) | 78.9.21 | 種子4小袋 | 桃園改良場 | |
| 蘿蔔(大丸聖護院大根) | 78.9.21 | 種子4小袋 | 鳳山園試分所 | 不適應氣候，無法採種。 |
| 洋蔥(泉州黃玉蔥) | 78.9.21 | 種子2小袋 | 鳳山園試分所 | 不適應氣候，無法採種。 |
| 洋蔥(玉豐) | 78.9.21 | 種子4小袋 | 鳳山園試分所 | 不適應氣候，無法採種。 |
| 南瓜 Zucchini | 78.9.21 | 種子2小袋 | 農試所園藝系 | 試種結果，不適本省氣候，毒素病發生嚴重，缺乏實用價值，僅供為蔬菜種原保存。 |
| Black Beauty | 78.9.21 | 種子2小袋 | 農試所園藝系 | 試種結果，不適本省氣候，毒素病發生嚴重，缺乏實用價值，僅供為蔬菜種原保存。 |
| Dark Star | 78.9.21 | 種子1小袋 | 農試所園藝系 | 試種結果，不適本省氣候，毒素病發生嚴重，缺乏實用價值，僅供為蔬菜種原保存。 |
| Early Summer Crookneck | 78.9.21 | 種子1小袋 | 農試所園藝系 | 試種結果，不適本省氣候，毒素病發生嚴重，缺乏實用價值，僅供為蔬菜種原保存。 |

| 種　　類 | 引進日期 | 數　　量 | 試種單位 | 現　　況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Early Prolific Straigut-neck | 78.9.21 | 種子1小袋 | 農試所園藝系 | 試種結果，不適本省氣候，毒素病發生嚴重，缺乏實用價值，僅供爲蔬菜種原保存。 |
| Bennings Green Tint | 78.9.21 | 種子1小袋 | 農試所園藝系 | 試種結果，不適本省氣候，毒素病發生嚴重，缺乏實用價值，僅供爲蔬菜種原保存。 |
| 胡蘿蔔（黑田五寸） | 78.9.21 | 種子2小袋 | 農試所園藝系 | 本省無法留種，78年試種後已結束。 |
| 菜　豆 (Anasazi Beans) | 78.10.5 | 種子1磅 | 農試所園藝系 | 缺乏實用價值，僅供爲蔬菜種原保存。 |
| 蒓　菜（西湖純菜） | 78.10.23 | 種苗5公斤 | 農試所園藝系 | 目前仍栽培於本所北溫室水箱中，繼續栽培觀察，以流水方式栽培，夏季生長良好，冬季不耐低溫。 |
| 西　瓜（農委80號） | 78.10.26 | 種子100公克 | 鳳山園試分所 | 生長不良，適應性差，已淘汰。種原無保存。 |
| | | | 種苗場 | 1.本品種生育期生長勢略弱，果肉紅色，單果重平均2.1公斤，瓤質中等，生育後期易罹根　及炭疽病。<br>2.經試種結果，缺乏實用價值，僅保存作種原之用。 |
| 大紅茄子（農委82號） | 78.10.26 | 種子80公克 | 高雄改良場 | 於82年秋作仍繼續栽培觀察，並進行品種純化及抗病蟲害特性檢定。園藝性狀調查結果得知本品系生長勢極強，豐產且食味優良，唯果形呈短胖形，不符本省市場需求，僅可做雜交育種之親本。種子已做蔬菜種原保存。 |
| 芹　菜（農委83號） | 78.10.26 | 種子80公克 | 農試所園藝系 | 試種結果，缺乏實用價值，已繁殖種子保存。 |
| 青皮甜瓜（農委81號） | 78.10.26 | 種子120公克 | 農試所園藝系 | 經播種3次，均不發芽。 |
| | | | 台南農改場 | 於78年12月播種，苗期初期生育良好，後期發育不良，已淘汰。 |

| 種類 | 引進日期 | 數量 | 試種單位 | 現況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水仙 | 79.2.2 | 種球一批 | 桃園改良場 | 經本場試驗結果至目前有許多子球，尚未開花，種球生育速率慢，不符精緻農業之低成本高效率之產業，缺乏實用價值。 |
| 小夏柳橙 | 79.6.25 | 種子17粒 | 嘉義試驗分所 | 1.播種後成活10株，其中8株生育較好，未開花。<br>2.目前種植於嘉義分所果園，平均株高約2.1公尺。<br>3.目前仍繼續栽培觀察中。 |
| 李<br>(農委85號) | 79.9.14 | 種子9粒 | 農試所園藝系 | 蜜李系，育苗7株，約0.5公尺，生育差，低溫需求高，定植於本所苗圃。 |
| 苦瓜<br>(農委86號) | 79.9.14 | 種子26粒 | 農試所園藝系 | 已當作苦瓜育種材料，現仍繼續栽培觀察。 |
| 胡瓜<br>(農委86號) | 79.9.14 | 種子26粒 | 農試所園藝系 | 試種結果，缺乏實用價值，僅當作蔬菜種原保存。 |
| 新疆香梨 | 79.11.28 | 種子155粒 | 農試所園藝系 | 育苗56株，平均株高60公分(30-100公分)，定植本所苗圃。 |
| 櫻桃 | 80.2.27 | 果苗6株 | 農試所園藝系 | 目前尚缺乏實用價值，作種原保存，共6株，平均株高2公尺，果實品質不佳，定植於本所園藝系。 |
| Quinoa | 80.3.14 | 種子1包 | 農試所園藝系 | 作爲種原保存材料(農藝系)。 |
| 甜金桔 | 80.3.14 | 種子1包 | 農試所園藝系 | 未發芽。 |
| 徐州碭山梨 | 80.6.3 | 接穗30枝 | 農試所園藝系 | 接穗未成熟，細嫩，嫁接均未成活。 |
| 「小夏」橙 | 80.6.6 | 種子19粒 | 農試所園藝系 | 種子發霉，均未發芽 |
| 杏 | 80.7.20 | 種子5粒 | 農試所園藝系 | 育苗3株，高約0.8公尺，生育中等，種植於本所園藝系。 |
| 哈密瓜 | 80.7.20 | 種子1包 | 農試所園藝系 | 當作甜瓜育種材料，繼續選種中。 |
| 西瓜 | 80.7.20 | 種子1包 | 農試所園藝系 | 極易感毒素病，無法採種，未再試種。 |

| 種　類 | 引進日期 | 數　量 | 試種單位 | 現　況 |
|---|---|---|---|---|
| 馬奶子葡萄 | 80.7.20 | 枝條2枝 | 農試所園藝系 | 2株，82年修剪後無花芽產生，種植於本所溫室。 |
| 蟠　桃 | 80.7.20 | 種子3粒 | 農試所園藝系 | 種子發霉，均未發芽 |
| 無核白葡萄 | 80.7.20 | 枝條2枝 | 農試所園藝系 | 扦插未成活 |
| 乾猴頭菇 | 80.11.21 | 5粒 | 農試所園藝系 | 已乾製作爲標本(植病系) |
| 甜辣椒(海豐一號) | 81.7.28 | 種子50公克 | 農試所園藝系 | 生長勢強，產量高，有利用價值，目前已經繁殖留種，待繼續栽培觀察。 |
| 花椰菜(白豐) | 81.7.28 | 種子50公克 | 農試所園藝系 | 易罹患病蟲害，缺乏實用價值，已停止試作，種原已保存。 |
| 甘藍(中甘8號) | 81.7.28 | 種子25公克 | 農試所園藝系 | 球質疏鬆，易裂球，缺乏實用，種原已保存。 |
| 番茄(甲豐) | 81.7.28 | 種子25公克 | 農試所園藝系 | 生長勢強，豐產，具利用價值，目前已繁殖留種，待繼續栽培觀察。 |
| 白菜(小染56) | 81.7.28 | 種子25公克 | 農試所園藝系 | 球大，直筒形，品質佳，值得進一步栽培觀察，種原已保存。 |
| 西瓜(新彊砲彈瓜) | 81.7.28 | 種子50粒 | 農試所園藝系 | 缺乏實用價值，毒素病發生嚴重，僅當作種原保存用。 |
| 大白菜(魯白6號) | 81.7.28 | 種子50公克 | 農試所園藝系 | 株高39公分，球爲圓錐形，肥大，品質佳，有進一步栽培觀察之必要，種原已保存。 |
| 甜香瓜 | 81.9.26 | 種子1小袋 | 農試所園藝系 | 爲胡瓜之一種，缺乏實用價值，現已繁殖種子供爲種原保存。 |
| 扁形水蜜桃 | 81.9.26 | 種子7粒 | 農試所園藝系 | 胚退化，無法繁殖。 |
| 香　芋 | 82.3.26 | 種球17粒 | 高雄農改場 | 於82年6月行單球種植，並於11月採收調查。試種結果得知，香芋屬豆科作物，不適應高屏地區夏季之炎熱氣候，開花後不結種子，且地下部所形成之塊根(種球)少且小，缺乏實用價值。將於83年秋作繼續試種及評估。 |
| 新疆貢梨 | 84.2.23 | 種子49粒 | 農試所種原室 | 育成苗35株旺盛生長中 |

國家圖書館出版品預行編目資料

蔣資政彥士歷年引進作物種原圖鑑／林俊義，范明仁，溫英杰編· --臺中縣霧峰鄉：省農試所，民85
面： 公分
ISBN 957-00-6982-1(平裝)

1. 植物－選種

432.83 85003190

蔣資政彥士歷年引進作物種原圖鑑

編輯者：林俊義·范明仁·溫英杰
發行人：林俊義
發行所：台灣省農業試驗所
地址：台中縣霧峰鄉中正路189號
電話：(04)3302301
承印者：農世股份有限公司
地址：台中市漢口路三段55巷21號
電話：(04)2932036
中華民國八十五年三月出版 非賣品

ISBN 957-00-6982-1(平裝)

統一編號

030859850044

ISBN 957-00-6982-1(平裝)